

Übungen zur Vorlesung Funktionalanalysis

Aufgabe 2.1 (4 Punkte)

Sei X ein topologischer Raum. Eine Menge $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn ihr Komplement offen ist. X heißt normal, wenn einpunktige Mengen abgeschlossen sind und für zwei disjunkte, abgeschlossene Mengen A und B offene Mengen U und V existieren mit

$$A \subset U, B \subset V \text{ und } U \cap V = \emptyset.$$

Zeigen Sie, dass jeder metrische Raum normal ist.

Aufgabe 2.2 (4 Punkte)

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen und beschränkt, $1 \leq p \leq \infty$ und $\mathcal{L}^p(\Omega)$ der Raum der p -integrierbaren bzw. wesentlich beschränkten Funktionen bezüglich des Lebesgue-Maßes. Sind die zugehörigen \mathcal{L}^p -Normen auf dem Raum $\mathcal{L}^\infty(\Omega)$ äquivalent? Beweisen Sie Ihre Aussage.

Aufgabe 2.3 (6 Punkte)

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum über \mathbb{K} . Zeigen sie, dass die Norm genau dann von einem Skalarprodukt herrührt, wenn die sogenannte Parallelogrammgleichung gilt:

$$\forall x, y \in V: \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Aufgabe 2.4 (2 Punkte)

Zeigen Sie, dass der Raum $C^0([0, 1])$ mit der \mathcal{L}^1 -Norm nicht vollständig ist.

Abgabe: Freitag, 04.05.2012, 17 Uhr.