

Übungen zur Vorlesung Funktionalanalysis

Aufgabe 7.1 (4 Punkte)

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen und beschränkt. Bestimmen Sie ein Funktional $\phi \in (L^\infty(\Omega))'$, welches sich nicht in der Form

$$f \mapsto \int_{\Omega} fg,$$

mit $g \in L^1(\Omega)$ schreiben lässt.

Aufgabe 7.2 (4 Punkte)

Beweisen Sie, dass ein lineares Funktional

$$f: l^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

existiert, sodass

$$\forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}}: \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq f((a_n)_{n \in \mathbb{N}}) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Aufgabe 7.3 (2+2 Punkte)

Ein Banachraum X heißt gleichmäßig konvex, wenn für alle $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle $x, y \in X$ mit $\|x\| = \|y\| = 1$

$$\left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| > 1 - \delta \Rightarrow \|x - y\| < \epsilon.$$

Beweisen Sie

- (1) Weder $L^\infty(\mathbb{R})$ noch $L^1(\mathbb{R})$ sind gleichmäßig konvex.
- (2) Jeder Hilbertraum ist gleichmäßig konvex.

Aufgabe 7.4 (3+1 Punkte)

Sei Ω ein Maßraum mit Maß μ .

- (1) Zeigen sie, dass für $f, g \in L^p(\Omega, \mu)$, $2 \leq p < \infty$

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p$$

gilt.

- (2) Folgern Sie, dass die Räume $L^p(\Omega, \mu)$, $2 \leq p < \infty$, gleichmäßig konvex sind.

Abgabe: Freitag, 08.06.2012, 17 Uhr.